

Narcan es de corta duración y solo dura entre 30 y 90 minutos, así que asegúrese de monitorear a la persona durante al menos 3 horas

EN CASO DE DUDA DAR NARCAN



Porque Narcan bloquea los receptores de opioides, es posible que alguien sufra una abstinencia grave y repentina

EL ACTO DEL BUEN SAMARITANO DE FLORIDA

Protege a la persona que experiencia la sobredosis y a la persona que hace la llamada de ser acusada de droga simple posesión




MITOS COMUNES sobre sobredosis

- darle a alguien un estimulante para despertarlo
- ponerlos en un baño frío o hacer que se vayan caminando
- administrar agua salada IV



Contacto:
 outofharmreach.harmreduction@gmail.com
 Facebook: Out of Harm's Reach
 Instagram: @outofharmreach_gnv
 Donar:
 Venmo: @OutofHarmsReach
 PayPal: email address

NARCAN 101
 mini zine



Reconocimiento de Sobredosis y Respuesta
 by: Out of Harm's Reach

Los opioides son un grupo de medicamentos que a menudo se recetan para controlar el dolor (oxicodona, morfina, heroína, fentanilo)

Narcan es una droga que puede revertir temporalmente los efectos de una sobredosis de opioides

Narcan funciona eliminando las moléculas de opioides de los receptores en el cerebro y previene temporalmente que regresen, lo que ayuda a restaurar la función respiratoria

- SIGNOS Y SÍNTOMAS** de una sobredosis de opioides
- respiración lenta, irregular o sin respiración
 - latidos lentos o nulo
 - piel pálida y húmeda
 - señalar pupilas
 - somnolencia extrema
 - inconsciencia

- PASOS BÁSICOS DE PRIMEROS AUXILIOS**
1. Si encuentras a alguien inconsciente intenta despertarlo
 2. Si no se despiertan, llame para pedir ayuda y siga los siguientes pasos para darle Narcan mientras está en la llamada
 3. Poner a la persona boca arriba
 4. dar dos respiraciones de rescate
- (respiraciones grandes y profundas mientras mantiene la nariz cerrada y echa la barbilla hacia atrás, asegurándose de que su pecho se eleve)
-
5. Retire el Narcan del paquete de aluminio

6. Coloque el Narcan en la fosa nasal de la persona y presione el émbolo
7. Si necesita irse, gire a la persona sobre su costado y colóquela en la posición de recuperación
8. Continúe con la respiración boca a boca (1 respiración cada 5 segundos) o RCP si es necesario
9. Dé una nueva dosis de Narcan cada 2-3 minutos Si la respiración de la persona no ha mejorado

